

KALENDAR KONTINUIRANOG CIJEPLJENJA U REPUBLICI HRVATSKOJ U 2018. GODINI

Novorođenčad: BCG vakcinacija

- a) Ako su rođena u rodilištima cijepit će se BCG cjepivom odmah u rodilištu.
- b) Ukoliko nisu rođena u rodilištu cijepit će se BCG cjepivom do navršena dva mjeseca starosti
- c) Sva djeca koja nisu cijepljena u rodilištu odnosno do dva mjeseca starosti moraju se cijepiti BCG cjepivom do navršene prve godine života.

Novorođenčad HBsAg-pozitivnih majki (sve trudnice se obvezno testiraju): hepatitis B imunizacija uz primjenu imunoglobulina, u rodilištu odmah po rođenju (NN 103/13), prema postekspozicijskoj shemi.

S navršena dva mjeseca života: Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB

Nakon 2 mjeseca (8 tjedana): Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB

Nakon 2 mjeseca (8 tjedana): Kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB

2. godina života:

- po navršenih 12 mjeseci života OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBELA (MO-PA-RU)

- kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib ili kombinirano cjepivo DTaP-IPV-Hib-hepB (6-12 mjeseci nakon treće doze DTaP-IPV-Hib-hepB)

6. godina života:

DI-TE-PER acelularno (DTaP) ili dTap

I razred osnovne škole:

OSPICE-ZAUŠNJACI-RUBELA (MO-PA-RU) (ili prilikom upisa) + POLIO (IPV) prilikom upisa ili najkasnije u rujnu. Provjera cijepnog statusa i nadoknada propuštenih cijepjenja prema potrebi.

VI razred osnovne škole:

HEPATITIS B: 2 puta s razmakom od mjesec dana i treći puta pet mjeseci nakon druge doze

VIII razred osnovne škole:

Td (DI-TE pro adultis) ili dTap + POLIO (IPV)

Završni razred srednjih škola:

Provjera cijepnog statusa i nadoknada propuštenih cijepjenja prema potrebi

24 godine starosti:

Provjera cijepnog statusa i nadoknada propuštenog Td cijepjenja prema potrebi

Nakon navršenih 60 godina života:

ANA-TE

KALENDAR CIJEPLJENJA 2018.

NAVRŠENA Dob Cjepivo	MJESECI				GODINE		RAZRED osnovne škole			GODINE		
	0	2	4	6	1	5	I.	VI.	VIII.	19	24	60
BCG												
Hib												
Di-Te-Per							*					
Polio										*		
Di-Te							*			*	*	
Mo-Pa-Ru												
Hepatitis B ¹							*	3x				
ANA-TE												

¹ cijepi se i novorođenčad HBsAg pozitivnih majki odmah po rođenju uz primjenu imunoglobulina prema postekspozicijskoj shemi (NN 103/13)

* Provjera cijepnog statusa i nadoknada propuštenog cijepljenja, prema potrebi